

徒長防止、着蕾増・着果強化  
着色増進、糖度アップに！



# 色一番E

葉面散布用 粉状液肥 1kg入り



色一番Eを使用すると写真のように着色が良くなります。

## 特長

0%	+	42%	+	28%	+	苦土    モリブデン マンガン   亜鉛 ホウ素    銅 鉄
チッソ		リン酸		カリ		微量元素

- リン酸、カリの成分量が多いため、徒長防止、着蕾増・着果強化、着色増進、果実肥大、糖度アップに効果があります。
- 1500~2000 倍の低濃度で使用できるため、経済的です。



ロイヤル インダストリーズ株式会社

〒201-0003 東京都狹江市和泉本町一丁目 15-19

TEL 03-3489-1408 FAX 03-3489-9308

## 使用目的と使用方法

標準使用倍率：1000～2000倍 （1000倍に薄めたときのPHは 6.3）

海藻エキス「ケルパック66」と混用するとさらに効果が高まります。

作物名		使用目的	散布間隔と回数	ケルパック66 混用倍率
苗全般		健苗育成	育苗期1～3週あけて1～2回	5000倍
果樹	りんご みかん サクランボ	着蕾・着果強化 徒長防止	伸長期に2～4週あけて1～2回	1500～ 2000倍
	桃・梨・柿 キウィ・ぶどう	果実肥大 着色促進 糖度アップ	収穫の1～3ヶ月前から 2～4週あけて2回 (桃には1500～2000倍が最適)	3000倍 <small>(この時期の温州みかん には処理しない)</small>
	ぶどう	花振り防止	5～6葉期と開花20～10日前に 1000倍液を各1回	1000倍
果菜類	メロン すいか トマト・なす ピーマン きゅうり いちご	徒長防止 着蕾・着果強化 肥大・成熟促進 成り疲れ防止 収量アップ 食味向上	着蕾期から 2～4週おきに3～5回	3000倍
葉菜類	ほうれん草 レタス・白菜 キャベツ	健苗育成 徒長防止(チリ中和) 品質向上	本葉2～3枚頃、または定植直後から 1～3週あけて2回	3000倍
根菜類	にんじん 大根・かぶ ごぼう	健苗育成 徒長防止(チリ中和) 品質向上	本葉2～3枚頃から、 1～3週あけて2回	1500倍
草花		着蕾促進 花色強化	着蕾前と、開花前の計2回	3000倍

\*葉面散布の代わりに土壌灌水する場合は、1～5kg/10aを1000～2000倍にうすめ灌水チューブで流します。

## 成分

水溶性リン酸	42.0%	鉄	0.10%
水溶性カリ	28.0%	モリブデン	0.05%
水溶性苦土	2.0%	亜鉛	0.05%
水溶性マンガン	0.4%	銅	0.01%
水溶性ホウ素	0.5%		

## 注意事項

- 石灰硫黄合剤と混ぜると有毒ガスが発生する恐れがありますので混用しないで下さい。
- 本品は吸湿性が高いので、使用後はチャックをしっかりと閉めて保管して下さい。  
吸湿し、べとついてしまっても効力に変わりはありませんので、安心してご使用下さい。
- 幼児の手の届かないところに保管して下さい。